Comment bien vieillir avec la micro-immunothérapie

27/06/2023

Maeva MENE

Document réservé exclusivement aux professionnels de santé

SOMMAIRE

1. Introduction : la **micro-immunothérapie**, une approche innovante du vieillissement
2. Inflammation et vieillissement : comprendre le concept de l'**inflammaging**
3. Prévenir la **dégénérescence systémique** liée au vieillissement
4. Les **mitochondries** : clés de voûte de la régulation du vieillissement
5. Les **formules de l'aging** : une approche personnalisée pour mieux vieillir

Loi d'Hormèse

- La **loi d'Hormèse** s'applique non seulement à la micro-immunothérapie, mais également à la vie elle-même !

Exemple : interaction entre le vieillissement, l'hormèse et les maladies neurodégénératives - <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3427272/>

L'inflammAGEing

InflammAGEing

L'inflammaging

- **Inflammaging** = inflammation chronique de bas grade liée au vieillissement.
- **Immunosénescence** : mécanisme adaptatif pour contrer l'environnement pro-inflammatoire lié à l'âge.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9470900/figure/ace113700-fig-0001/>

L'inflammaging

Inflammation aiguë

Provoquée par : agressions, plaie, infection...

Quelques minutes à quelques jours

Localisée

Dolor/ Rubor / Tumor / Calor

Résolution/guérison : élimination de l'agresseur, réparation des tissus, pas ou peu de traces

Inflammation chronique

Provoquée par : obésité, toxiques, perméabilité intestinale

Plusieurs semaines ou années

Localisée ou généralisée

Évolue silencieusement, pas ou peu de symptômes, douleurs

Dégâts pérennes sur les tissus et dégradation : vieillissement accélérés et pathologies inflammatoires...

Age ↑

Inflammatory cytokines ↑

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9470900/figure/ace113700-fig-0001/>

Processus de sénescence

DAMPs, PAMPs → stress oxydatif → dégradation des télomères des macrophages → altération de l'immunosurveillance et de la phagocytose → dysfonctionnement au niveau des cellules et des organes → augmentation de la susceptibilité aux maladies liées à l'âge.

Formule INFLAM

Régulation à la hausse de l'activité biologique dans l'organisme :

- Interleukin 1 Ra (IL-1 Ra)
- Interleukin 10 (IL-10)
- Plateled Derived Growth Factor (PDGF)
- Transforming Growth Factor beta (TGF-B)

Maintien de l'activité biologique dans l'organisme :

- Interleukin 2 (IL-2)
- Interleukin 4 (IL-4)
- Interleukin 6 (IL-6)
- Oncostatin M (OSM)
- Interleukin 8 (IL-8)
- Interleukin 13 (IL-13)

Régulation à la baisse de l'activité biologique dans l'organisme :

- Prostaglandine E2 (PGE2)
- Ciliary Neuro Trophic Factor (CNTF)
- Interleukin 1 (IL-1)
- Rantes
- Leukemia Inhibitory Factor (LIF)
- Specific Nucleic Acid SNA®-INFLAM a-01
- Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α)
- Specific Nucleic Acid SNA®-INFLAM b-01

Action sur la cascade des événements inflammatoires en cause dans les troubles chroniques / vieillissement.

1 à 3 gél./j jusqu'à amélioration clinique.

Figure 6 : Schématisation du mode d'action de la formule INFLAM.

Formule SEN

Régulation à la hausse de l'activité biologique dans l'organisme :

<u>Ciliary Neuro Tropic Factor (CNTF)</u>	<u>Leukemia Inhibitory Factor (LIF)</u>
<u>Dehydroepiandrosterone (DHEA)</u>	<u>Nerve Growth Factor (NGF)</u>
<u>Fibroblast Growth Factor basic (FGFb)</u>	<u>Neurotrophin 3 (NT3)</u>
<u>Glial Derived Neurotrophic Factor (GDNF)</u>	<u>Neurotrophin 4 (NT4)</u>
<u>Insulin Growth Factor 1 (IGF1)</u>	<u>Plateled Derived Endothelial Cell Growth Factor (PDEC GF)</u>
<u>Interleukin 6 (IL-6)</u>	<u>Transforming Growth Factor beta (TGF-B)</u>

Maintien de l'activité biologique dans l'organisme :

<u>Deoxyribunocleic acid (DNA)</u>	<u>Interleukin 2 (IL-2)</u>	<u>Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α)</u>
<u>Epidermal Growth Factor (EGF)</u>	<u>Interleukin 12 (IL-12)</u>	
<u>Interferon Beta (IFN-b)</u>	<u>Interleukin 13 (IL-13)</u>	
<u>Interleukin 1 (IL-1)</u>	<u>Ribonucleic acid (RNA)</u>	

Régulation à la baisse de l'activité biologique dans l'organisme :

<u>Specific Nucleic Acid SNA[®]-HLA I-01</u>	<u>Specific Nucleic Acid SNA[®]-MISENb-01</u>
<u>Specific Nucleic Acid SNA[®]-HLA II-01</u>	<u>Specific Nucleic Acid SNA[®]-MISENc-01</u>
<u>Specific Nucleic Acid SNA[®]-MISENa-01</u>	<u>Specific Nucleic Acid SNA[®]-MISENd-01</u>

Formule anti-aging par excellence pour ceux qui souhaitent maintenir une bonne forme physique et intellectuelle à partir d'un certain âge.

Protection des systèmes : nerveux, hormonaux, immunitaires, cutanés...

En cure de 1 à 3 mois puis 10 jours/mois pendant 6 mois à un an.

La mitochondrie

La mitochondrie

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6893295/>

© EMBO

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9924952/>

Un rôle crucial dans le vieillissement !

Pour aller plus loin sur la découverte des fonctions mitochondriales :

Picard M, Shirihai OS. Mitochondrial signal transduction. Cell Metab. 2022 Nov 1;34(11):1620-1653. doi: 10.1016/j.cmet.2022.10.008. PMID: 36323233; PMCID: PMC9692202.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36323233/>

La mitophagie

La mitophagie, un véritable « **contrôle qualité** » d'une mitochondrie optimale !

Les mitokines

Rôles des mitokines dans la réponse inflammatoire :

- paralysie immunitaire des macrophages ;
- diminution des anticorps protecteurs ;
- suppression immunitaire.

Burtscher J, Soltany A, Visavadiya NP, Burtscher M, Millet GP, Khoramipour K, Khamoui AV. Mitochondrial stress and mitokines in aging. *Aging Cell*. 2023
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9924952/>

Les mitokines

Mitokines associées au vieillissement, un équilibre à trouver :

- **GDF15** : associée aux maladies de civilisation ;
- **FGF21** : hormone pro-longévité ;
- **HN** : facteur anti-apoptose et protecteur cellulaire.

Conte, M., Martucci, M., Chiariello, A. et al. Mitochondria, immunosenescence and inflammaging: a role for mitokines?. *Semin Immunopathol* 42, 607-617 (2020). <https://link.springer.com/article/10.1007/s00281-020-00813-0>

Formule MIREG

Régulation à la hausse de l'activité biologique dans l'organisme :

Prostaglandin E2 (PGE2)

Régulation à la baisse de l'activité biologique dans l'organisme :

Interleukin 1 (IL-1)

Interleukin 2 (IL-2)

Interleukin 5 (IL-5)

Interleukin 6 (IL-6)

Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF- α)

Transforming Growth Factor Beta (TGF-B)

Deoxyribonucleic acid (DNA)

Ribonucleic acid (RNA)

Specific Nucleic Acid SNA[®]-HLA I

Specific Nucleic Acid SNA[®]-HLA II

Specific Nucleic Acid SNA[®]-MIREG

Action régulatrice sur :

- A. Le stress oxydatif mitochondrial : **ARN, IL-1, TNF- α** ;
- B. Le métabolisme mitochondrial (respiration, ATP) : **IL-6, PGE2** ;
- C. L'immunité et le phénomène d'apoptose : **IL-5, IL-2, TGF-B, SNA-HLA I, SNA-HLA II, ADN** ;
- D. Modulation des gènes liés à la régulation mitochondriale.

Formule MIREG

Les pathologies liées au vieillissement

La neuro-inflammation

Accumulation de protéines mal repliées →
inclusions cellulaires et plaques séniles

+ Neuro-inflammation

Le neuro-inflammaging

Cytokines à la base de l'inflammation
cérébrale : IL-1, IL-6, TNF- α , COX-2 et PGE-2

→ Troubles cognitifs et modification de
l'humeur

+ Perméabilité de la BHE

+ Stress oxydatif

+ Auto-immunité

Quelle cause relie toutes ces... causes ?

L'axe intestin-cerveau

Formule MISEN

Régulation à la hausse de l'activité biologique dans l'organisme :

Dehydroepiandrosterone (DHEA)
Dimethyl Sulfoxide (DMSO)

Maintien de l'activité biologique dans l'organisme :

Interleukin 2 (IL-2)
Epidermal Growth Factor (EGF)

Ribonucleic acid (RNA)

Régulation à la baisse de l'activité biologique dans l'organisme :

Specific Nucleic Acid SNA[®]-HLA I
Specific Nucleic Acid SNA[®]-HLA II
Specific Nucleic Acid SNA[®]-MISEN

Formule MISEN

Ses objectifs :

- prévenir l'épuisement immunitaire lié à la sénescence et au stress chronique ;
- améliorer la défense immunitaire ;
- contrer les effets pro-inflammatoires ;
- favoriser la régénérescence cellulaire et le rajeunissement ;
- augmenter la capacité anti-tumorale et antiproliférative.

Effect of 2LMISEN® on Long-Term Hippocampal Neurons Culture as a Screening Senescent Cells Model : p16INK4a and Caspase 3 Quantification. Advances in Aging Research" by Lilli, NL., Révy, D., Volteau, C., Robelet, S., Lejeune, B.

https://mcusercontent.com/8e91f9893fd5944c0b88373ed/files/0e2eb4bc-5c79-146d-bffc-b60e40eb9cf1/fr_2LMISEN.pdf

Formules de la cognition

Formule MEM-SENIOR

Formule MdA

Domaines d'application

- Perte de mémoire
- Troubles de la concentration

- Maladie d'Alzheimer
- Démence (stade initial)

Posologie

1 gélule/jour, 6 mois ou plus

1 gélule/jour, 6 mois ou plus

Objectifs immunomodulateurs

- Freiner l'inflammation et le stress oxydatif
- Favoriser la neuroprotection et la régénération neuronale
- Améliorer la capacité à mémoriser
- Freiner l'inflammation et le stress oxydatif
- Favoriser la neuroprotection et la régénération neuronale
- Moduler le métabolisme des β -amyloïde
- Limiter la neurodégénérescence
- Améliorer la capacité à mémoriser et réduire les troubles du comportement

Degenerative Neurological and Neuromuscular Disease

Dovepress

open access to scientific and medical research

Open Access Full Text Article

ORIGINAL RESEARCH

Effect of the micro-immunotherapy medicine 2LPARK[®] on rat primary dopaminergic neurons after 6-OHDA injury: oxidative stress and survival evaluation in an in vitro model of Parkinson's disease

Results: We showed that, contrary to placebo, MIM was able to reduce oxidative stress and protect DAergic neurons from 6-OHDA-induced cell death.

Conclusion: Our results demonstrate the in vitro efficacy of MIM on two essential mechanisms of PD and propose the MI approach as a new ally in the regulation of neuroinflammation and in the treatment of this degenerative disease.

Troubles ostéoarticulaires

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6026810/>

Sustaining of sterile inflammation process by the DAMPs and AGEs through the activation of the SASP by senescent cells and associated therapeutic targets in joint during OA

Formules ARTH, OSTEO-N

Actions de ARTH :

- Soulager la douleur et l'intensité de l'inflammation
- Prévenir les lésions, la perte de fonction et le passage à la chronicité
- Réduire l'inflammation, l'œdème et la dégradation du collagène

Actions de OSTEO-N :

- Freiner les voies ostéoclastiques et optimiser les voies ostéoblastiques
- Normaliser l'apoptose des ostéoblastes
- Inhiber les cytokines pro-inflammatoires

Publication OSTEON

<https://www.mdpi.com/1422-0067/24/13/10484>

*International Journal of Periodontology, traite de l'effet de la formule OSTEON sur deux modèles in vitro de parodontite.

« The results obtained in this study show, for the first time, that the sequential MI treatment, referred to as MIM-seq, effectively reduces inflammatory marker PGE2 on inflamed hGFs. MIM-seq also showed regenerative properties as well as interesting effects on collagen metabolism in the inflamed hGFs and 3D oral mucosa in vitro models of periodontitis. Therefore, in our preclinical research study, we report preliminary encouraging pieces of evidence about the in vitro efficacy of MIM-seq, which could be a promising treatment for periodontitis ».

[Sequential Micro-Immunotherapy Medicine Increases Collagen Deposition in Human Gingival Fibroblasts and in an Engineered 3D Gingival Model under Inflammatory Conditions](#)

Formules de l'aging

Protection du capital osseux •

Protection articulaire
/ inflammation aiguë

Protection neuronale
/ rétinienne

neurones

dopaminergiques

Régénération nerveuse

/ prévention amyloïdogénèse

• Inflammation chronique

• Protection de tous les systèmes

• Protection mitochondriale

• Modulation stress / immunité

• Performances cognitives

Merçi !