LE PSORIASIS

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui n'est pas contagieuse. Il est causé par un dérèglement immunitaire qui entraine une inflammation chronique et exagérée de la peau associée à une surproduction de kératinocytes, les cellules productrices de kératine qui composent majoritairement l'épiderme. Il en résulte une accumulation de ces cellules à la surface de la peau, augmentant l'épaisseur de la couche externe appelée cornée et expliquant la production des squames. La maladie peut apparaître à tout âge, mais il existe un pic entre 20 et 40 ans. Elle évolue par poussées dont la fréquence et l'intensité sont imprévisibles.

FACTEURS DE RISQUE

- Prédisposition génétique,
- Stress, choc émotionnel ou traumatisme,
- Infections (angine bactérienne, VIH, etc.).
- Prise de médicaments (lithium,
- bêtabloquants, antipaludéens etc.),Consommation d'alcool et de tabac.
- Modifications climatiques.

MANIFESTATIONS CLINIQUES

Formes légères :

- Plaques rouges présentant des pellicules blanches ou squames localisées sur les zones de frottements,
- Démangeaisons ou sensations de brûlures sur ces plaques.

Formes modérées à sévères :

- Plaques très étendues sur le corps (muqueuses, ongles, etc.),
- Associé à des atteintes articulaires douloureuses,
- Psoriasis érythrodermique, psoriasis pustuleux avec pustules jaunâtres, psoriasis associé au VIH.



CONSEILS & PRÉVENTION

- Éviter les frottements et le grattage des plaques,
- Hydrater régulièrement la peau,
- Arrêter le tabac et la consommation d'alcool
- Réduire le stress (repos et relaxation),
- Expositions modérées et régulières au soleil (selon les cas).



TRAITEMENTS HABITUELS

Formes légères (traitement locaux):

 Pommades, crèmes ou lotions à base de dermatocorticoïdes ou d'analogues de la vitamine D3.

Formes modérées à sévères :

- Traitements oraux: acitrétines, méthotrexate, ciclosporine, etc.,
- Photothérapie, biothérapie,
- Cures thermales



MICRO-IMMUNOTHÉRAPIE

Formule PSO

Les substances immunomodulatrices en faibles doses permettent de moduler à la hausse, à la baisse, ou de maintenir leur activité biologique dans l'organisme.

LA COMPOSITION DE LA FORMULE



IL-6, IL-8, IL-20, TNF- α , IFN- γ , bFGF, EGF, IGF-1, KGF, VEGF, SNA®-HLA I-01, SNA®-HLA II-01, SNA®-PSOa-01, SNA®-PSOb-01, IL-10, IL-13, TGF- α , Cyclosporine A

LES OBJECTIFS DE LA FORMULE



- IL-10, IL-13, I GF-α, Cyclosporine A
- Vise à réduire les symptômes et à améliorer la qualité de vie des patients,
 Cherche à prévenir les rechutes, l'aggravation et le développement des troubles associés.
- Soigne sans créer d'effets secondaires.

LES ACTIONS
DE LA FORMULE



Ø Rééquilibre le dérèglement immunitaire et freine l'inflammation.

Posologie

Formule **PSO** Phase aiguë



1 gélule/jour

pendant 1 an

4 à 6 mois selon évolution des symptômes

Traitement de fond



1 gélule, 1 jour/2

Le contenu des gélules doit être pris idéalement le matin à jeun ou en dehors des repas (20 min avant ou 1 h après.).



Document de l'Institut Français de Micro-immunothérapie élaboré à partir de l'expérience clinique des médecins experts e micro-immunothérapie des associations internationales de Micro-immunothérpie (IFMi, AEMI, MeGemit).